

Πremium εμβολιαστής για παραγωγή ενσίρωματος και βιοαερίου.

- Υψηλή συγκέντρωση γαλακτοβάκιλλων.
- Βελτίωση της ποιότητας του ενσίρωματος και αύξηση της ποσότητας παραγόμενου μεθανίου.

Δράση:

- Το **Josilac[®] ferm** διατηρεί το παραγόμενο ενσίρωμα σταθερό για περισσότερο διάστημα (υψηλή αερόβια σταθερότητα).
- Αποτελεσματικό σε ενσίρωματα με υψηλή Ξ.Ο.
- Εξασφαλισμένη διαδικασία ζύμωσης στο αρχικό στάδιο της.
- Δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος ενάντια στις μούχλες και στους μύκητες.
- Το υψηλής ποιότητας ενσίρωμα συντηρείται και προστατεύεται αποτελεσματικά από την αναθέρμανση.

Πλεονεκτήματα του Josilac ferm[®] στα ενσίρωματα για διατροφή:

- Μικρότερες απώλειες τροφής, χάρη στην υψηλή αερόβια σταθερότητά τους (μετά από έκθεση του στον αέρα).
- Υγιεινή, φρέσκια και δροσερή ζωτροφή, χάρη στην μείωση των απωλειών στη δευτερογενή ζύμωση λόγω θερμότητας.
- Καλύτερη ποιότητα τροφής χάρη στη μείωση της ανάπτυξης των μυκήτων. Έτσι μειώνεται η αρνητική τους επίδραση στην υγεία των ζώων σας.

Πλεονεκτήματα του Josilac ferm[®] στη ζύμωση για παραγωγή βιοαερίου:

- Διατήρηση των πολύτιμων ουσιών για το σχηματισμό καυσίμου, χάρη στην μειωμένη απώλεια της ξηράς ουσίας
- Μικρότερες απώλειες ενέργειας κατά την τροφοδοσία της δεξαμενής ζύμωσης (μεγαλύτερη αερόβια σταθερότητα).
- Αυξημένη παραγωγή αερίου χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα οξικού οξέος και 1,2-προπανοδιόλης, πρόδρομων ουσιών για την παραγωγή μεθανίου.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Γαλακτοβάκιλλοι 5.0×10^{10} CFU / g προϊόντος:
Lactobacillus buchneri DSM 22501 1k 20738
 Φορέας: Μαλτοδεξτρίνη

Τρόποι αποθήκευσης:

- Θερμοκρασία δωματίου (20 °C): 6 μήνες
- Ψυγείο (4-8 °C): 12 μήνες
- Κατάψυξη (-18 °C): 24 μήνες

Συγκέντρωση βιολογικού εμβολιαστή:

150.000 CFU / g ενσίρωσης

Δοσολογία: 3 g ανά τόνο Ξ.Ο ενσίρωσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το **Josilac[®] ferm** διαλύεται με καλή ανάδευση μέσα σε νερό (χωρίς χλώριο) και εφαρμόζεται ομοιόμορφα στο ενσίρωμα, σε ποσότητα 0,4 έως 2 λίτρα διαλύματος ανά τόνο.

Με τεχνολογία μικροδοσολογίας εφαρμόζεται σε υγρή μορφή 50-100 ml/τόνο στο ενσίρωμα.

Προτεινόμενη θερμοκρασία νερού: 18-30 °C

Το διάλυμα είναι άμεσα έτοιμο για χρήση και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 48 ώρες.

Το **Josilac[®] ferm** χρησιμοποιείται για ενσίρωση με ξηρά ουσία 30-60%.

Σημείωση: Το ενσίρωμα πρέπει να παραμείνει κλειστό για τουλάχιστον 6 – 8 εβδομάδες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Ο βιολογικός εμβολιαστής **Josilac[®] ferm** εισάγεται από τη Γερμανία σε συσκευασία 150g και επαρκεί για να καλύψει 50 τόνους ενσίρωματος.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ:

Τα προϊόντα της Josera πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχου των παρακάτω φορέων: DLG, LGA InterCert (ISO 9001: 2008, HACCP, GMP+), QAL GmbH (A Futter, QS).



090119

Κύριο εύρος εφαρμογής

Χόρτο, άνω του 30 % Ξ.Ο.	Ενσίρωμα αραβοσίτου	Ολόκληροι σπάδικες καλαμποκιού	Ενσίρωμα αγρωστωδών	Ενσίρωμα για παραγωγή βιοαερίου	Τεχνολογία μικροδοσολογίας (ULV)
•	•••	•••	••	•••	✓

ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.

3^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ
 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΤΗΛ: 2351025222, FAX: 2351025228

e-mail: info@viozokat.gr

www.viozokat.gr

JOSERA HELLAS A.E.

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
 54500 ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 2310534309